

Predación de la Raposa de cuatro ojos *Philander opossum* (Mammalia, Didelphidae) por el Gavilán Campestre *Rupornis magnirostris* (Aves, Accipitridae)

Predación de *Philander opossum* por *Rupornis magnirostris*

Jenny Curay^{1*}, Francisco Sornoza-Molina², Jorge Brito^{1,3}

¹Instituto Nacional de Biodiversidad, División de Mastozoología, Calle Rumipamba 341 y Av. de Los Shyrís, casilla postal 17-07-8976, Quito, Ecuador.

²Fundación Jocotoco, Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura. Casilla Postal 17-16-337. Quito, Ecuador.

³Instituto de Ciencias Biológicas, Escuela Politécnica Nacional, Casilla 17-01-2759, Quito, Ecuador.

Autor Principal/ Corresponding Author, e-mail: jaqui.curay@hotmail.com

Predation of the Gray Four-eyed Opossum *Philander opossum* (Mammalia, Didelphidae) by the Road-side Hawk *Rupornis magnirostris* (Aves, Accipitridae)

Abstract

Knowledge on the predation of medium-sized mammals by raptors is little known. In this note, we report the first known predation event of the Gray Four-eyed Opossum *Philander opossum* by a wild Roadside Hawk *Rupornis magnirostris*, at Reserva Ecológica Buenaventura, southwestern Ecuador.

Keywords. Birds, raptors, mammals, Ecuador

Resumen

El conocimiento sobre la predación de mamíferos medianos por parte de aves rapaces es aún poco conocido. En la presente nota reportamos por primera vez un evento de depredación de la raposa de cuatro ojos *Philander opossum* por el Gavilán Campestre *Rupornis magnirostris*, en la Reserva Ecológica Buenaventura, al suroeste del Ecuador.

Palabras Clave. Aves rapaces, mamíferos medianos, suroeste

Los mamíferos pequeños son considerados como la base de la cadena alimenticia de varios ecosistemas, formando parte de la dieta de depredadores como carnívoros y aves rapaces [1,2]. En las dietas estudiadas de varias aves rapaces, los mamíferos aportan con la mayor parte de la biomasa, siendo los roedores su fuente principal, seguido por otros vertebrados pequeños como aves, reptiles, anfibios y peces [2-4].

El Gavilán Campestre *Rupornis magnirostris* (Gmelin, 1788) a pesar de ser una ave muy común y contar con una amplia distribución que va desde México hasta Argentina,

escasos son los estudios que dan a conocer la dieta de esta especie [2]. El gavilán ocupa una gran variedad de hábitats desde áreas densamente boscosas hasta pastizales y áreas urbanas. Es una rapaz de tamaño mediano: largo total: 3142 cm, envergadura: 6492 cm, largo de la cola: 1319 cm, peso aproximado de 200 y 400 g, [5-7]. Hasta la actualidad se conoce que el Gavilán Campestre generalmente se alimenta de ciertos insectos, anfibios, aves mamíferas (roedores y marsupiales pequeños) y peces (Tabla 1) [5,8,9]. Dentro de los mamíferos las presas máximas reportadas corresponden a tres marsupiales de tamaño mediano *Chironectes minimus*, (Zimmermann, 1780), *Didelphis albiventris* (Lund, 1840) y *Lutreolina crassicaudata* (Desmarest, 1804) [6, 10] (Tabla 1). En el presente trabajo se documenta la predación de *Philander opossum* (Linnaeus, 1758) por *Rupornis magnirostris* en el suroccidente de Ecuador.

TABLA 1. Presas reportadas en la dieta del Gavilán Campestre

Presas	Peso promedio	Región	Referencia
MAMÍFEROS			
<i>Akodon azarae</i>	19 gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Calomys</i> sp.	16,5 gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	16-20 gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Oxymycterus rufus</i>	61-130 gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Holochilus brasiliensis</i>	131 gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Necromys obscurus</i>	20-50 gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Holochilus</i> sp.	90-320 gr	Argentina	[9]
<i>Ototylomys</i> sp.	120 gr	Guatemala	[22]
<i>Heteromys</i> sp.	88 gr	Guatemala	[22]
<i>Monodelphis dimidiata</i>	7,5 gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Sciurus deppei</i>	200-325 gr	Guatemala	[22]
<i>Chironectes minimus</i>	400-800 gr	Santa Catarina, Brasil	[6]
<i>Cavia aperea</i>	400-600 gr	Buenos Aires, Argentina	[10]
<i>Lutreolina crassicaudata</i>	600-1500 gr	Buenos Aires, Argentina	[10]
<i>Didelphis albiventris</i>	500-2000 gr	Buenos Aires, Argentina	[10]
<i>Lepus capensis</i>		Buenos Aires, Argentina	[10]
<i>Philander opossum</i>	340 gr	Ecuador	Este estudio
Chiroptera		Colombia, Brasil	[2,18]
AVES			
<i>Colaptes campestris</i>	158gr	Paraná, Brasil	[5]
<i>Chiroxiphia lanceolata</i>	14-19gr	Isla Boca Brava, Panamá	[21]
REPTILES			
<i>Hemidactylus mabouia</i>		Brasil	[20]
<i>Sceloporus</i> sp.		Guatemala	[22]
<i>Anolis</i> sp.		Guatemala	[22]
<i>Anolis</i> sp.		Ecuador	Este estudio
<i>Corythophanes</i> sp.		Guatemala	[22]
ANFIBIOS			
<i>Amphisbaena alba</i>	250-300gr	Paraná, Brasil	[5]
<i>Hypsiboas pulchellus</i>	0,00001gr	Buenos Aires, Argentina	[8]
<i>Hyla pulchella</i>		Argentina	[9]
<i>Bufo granulatus</i>		Argentina	[9]
<i>Caudata</i>		Guatemala	[22]
INSECTOS			
Artropodos		Paraná, Brasil	[5]
Orthoptera		Buenos Aires, Argentina	[8]



Presa	Peso promedio	Región	Referencia
Coleoptera		Buenos Aires, Argentina	[8]
Hemiptera		Guatemala	[22]
<i>Dichroplus</i> sp.		Argentina	[9]
PECES			
<i>Astyanax</i> sp.	69–90gr	Argentina	[9]
PLANTAS			
<i>Salix humboldtiana</i>		Argentina	[9]

La predación se registró el 10 de junio de 2005 en la Reserva Ecológica Buenaventura-Fundación de Conservación Jocotoco (-3,662019°S / -79,736005°W, 937 msnm), parroquia Moromoro, cantón Piñas, provincia de El Oro en Ecuador, recolectado por Francisco Sornoza. El área se encuentra en el ecosistema Bosque siempreverde piemontano del Catamayo – Alamor [11] perteneciente al piso zoogeográfico Tropical Suroccidental [12].

Rupornis magnirostris se reconoció por presentar pecho color gris claro y con bandas de color habano y gris oscuro en su cola, fue avistada a las 11:00 am cuando se alimentaba de un *Philander opossum* en la antigua carretera de Buenaventura-Piñas, el cual está rodeado de pastizales y remanentes de bosque. El Gavilán Campestre al sentirse persuadido por la presencia de extraños huyó del sitio, dejando caer la presa, el ejemplar sin una parte de su miembro inferior izquierdo fue colectado para su identificación, el espécimen (MECN 5028) corresponde a una hembra joven de *Philander opossum* con un peso de 340g. El ejemplar colectado presenta la base del pelaje claro y las puntas en el dorso gris negruzco, vientre amarillento; parte superior de la cola gris oscuro a negro, llegando hasta el ápice blanquecino; rostro oscuro grisáceo que contrasta con manchas de color crema sobre cada ojo, mentón y mejillas crema; orejas grandes y desnudas; nariz, labios y dedos rosados [13–16]. Y claramente se evidenció heridas en la parte posterior del cuerpo cerca del miembro superior derecho, y otras en la parte inferior cerca del abdomen, posiblemente provocadas por las garras (Fig. 1).

Adicionalmente se revisó la colección de ornitología del Instituto Nacional de Biodiversidad donde en la etiqueta del ejemplar MECN 6251, colectado el 5 de junio de 1992 en Pedro Vicente Maldonado Km 19N a 600 msnm, provincia de Pichincha en Ecuador por Fernando Sornoza en su contenido estomacal se encontró restos de insectos. En la etiqueta del ejemplar MECN 134, colectado el 23 de junio de 1987 a 1350 msnm en Zamora Chinchipe, provincia de Zamora en Ecuador por Niels Krabbe en su contenido estomacal se encontró restos de escarabajos y un roedor no identificado. Y en el ejemplar MECN7 055 colectado el 14 de noviembre de 1995 en la Carretera Pompeya Sur km 15 – Parque Nacional Yasuní, provincia Napo en Ecuador por Francisco Sornoza se encontró que en el detalle estomacal contenía la presencia de una lagartija del género *Anolis* e insectos.

La información de la dieta de *Rupornis magnirostris* actualmente es muy escasa, sin embargo los pocos trabajos realizados muestran que su alimentación es variada, ya que tiende a consumir desde insectos hasta pequeños vertebrados como reptiles, anfibios, aves, peces y mamíferos [2, 9, 10, 17–20]. En Panamá se encuentra un registro de la predación a un polluelo de *Chiroxiphia lanceolata* (Wagler, 1830) en su propio nido [21]. En cuanto a los mamíferos, en Guatemala el gavilán opta por mamíferos pequeños como *Heteromys* sp., *Otolomys* sp., *Sciurus deppei* (Peters, 1863) y murciélagos [22] en Argentina y Brasil se

alimenta de presas de talla mediana como *Didelphis albiventris*, *Lutreolina crassicaudata*, *Cavia aperea* (Erxleben, 1777), *Lepus capensis* (Linnaeus, 1758) y *Chironectes minimus* [6, 10], donde sus pesos sobre pasan los 200g como en nuestro caso *Philander opossum* pesa 340g. En cuanto a presas pequeñas, *Holochilus* sp., *Akodon azarae* (Fischer, 1829), *Calomys* sp., *Oligoryzomys flavescens* (Waterhouse, 1837), *Oxymycterus rufus* (Fischer, 181), *Holochilus brasiliensis* (Desmarest, 1819), *Necomys obscurus* (Waterhouse, 1837), *Monodelphis dimidiata* (Wagner, 1847), son parte de su dieta [6, 8–10], en otros países sudamericanos la dieta es desconocida. Por lo que nuestro hallazgo ayuda ampliar el conocimiento sobre la historia natural y dieta de *Rupornis magnirostris*, también se añade una especie más de mamífero a la lista de presas consumidas por el Gavilán Campestre. Donde futuros trabajos ayudarán a comprender los procesos de preferencias alimenticias de *Rupornis magnirostris*.

FIGURA 1. Vista dorsal y ventral de *Philander opossum* (MECN 5028); nótese las laceraciones en el flanco superior derecho y en la extremidad inferior izquierda. Longitud cabeza-cuerpo = 330 mm.



AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial a la Fundación de Conservación Jocotoco por todos estos años de esfuerzo en la conservación del patrimonio de flora y fauna, haciendo que el efecto mariposa sea positivo para todas las especies que habitan la Reserva Biológica Buenaventura. A César Garzón curador del área de ornitología del Instituto Nacional de Biodiversidad por permitir la revisión de ejemplares de *Rupornis magnirostris*.



CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Jenny Curay escribió el primer borrador del manuscrito, Francisco Sornoza-Molina recolectó el ejemplar e información ecológica asociada, Jorge Brito condujo el trabajo y realizó revisión crítica del manuscrito. Todos los autores aprobaron la versión final.

REFERENCIAS

- [1] Correa, P., Roa, A. (2005). Relaciones tróficas entre *Oncifelis guigna*, *Lycalopex culpaeus*, *Lycalopex griseus* y *Tyto alba* en un ambiente fragmentado de la zona central del Chile. *Mastozoología Neotropical*, 12(1), 57–60. Recuperado de <http://www.scielo.org.ar/pdf/mznt/v12n1/v12n1a06.pdf>
- [2] Márquez, C., Bechard, Marc., Gast, F., Vanegas, V. (2005). *Aves rapaces diurnas de Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá, D.C. Colombia.
- [3] Pardiñas, U., Cirignoli, S. (2002). Bibliografía comentada sobre los análisis de egagrópilas de Aves rapaces en Argentina. *Ornitología Neotropical*, 13, 31–59. Recuperado de <https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/on/v013n01/p0031-p0060.pdf>
- [4] Aragón, E., Castillo, B., Garza, A. (2002). Roedores en la dieta de dos aves rapaces nocturnas (*Bubo virginianus* y *Tyto alba*) en el noreste de Durango, México. *Acta Zoológica*, 86, 29–50. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/azm/n86/n86a3.pdf>
- [5] Santos, W., Rosado, F. (2009). Dados preliminares da biologia do Gavião-Carijó (*Rupornis magnirostris*, Gmelin, 1788) na região noroeste do Paraná. *Revista em Agronegócios e Meio Ambiente*, 2(3), 421–430. Recuperado de <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/view/901/850>
- [6] Tortato, M. (2009). Predação de Cuica-D'Água (*Chironectes minimus*: Mammalia, Didelphidae) por Gavião- Carijó (*Rupornis magnirostris*: Aves, Accipitridae). *Mastozoología Neotropical*, 16(2), 491–493. Recuperado de <http://ref.scielo.org/r983w4>
- [7] Ferguson, J., Christie, D. (2001). *Raptors of the world*. New York: Houghton Mifflin Company. Recuperado de <https://books.google.es/books?id=hIztc05HTQC>
- [8] Baladrón, A., Bó, M., Malizia, A., Bechard, J. (2011). Food Habits of the Roadside hawk (*Buteo magnirostris*) during the nonbreeding season in the southeastern Pampas of Argentina. *Journal of Raptor*, 45(3), 257–261. DOI: <http://dx.doi.org/10.3356/JRR-10-108.1>
- [9] Beltzer, A. H. (1990). Biología alimentaria del Gavilán común (*Buteo magnirostris saturatus*) (Aves: Accipitridae) en el Valle Aluvial del Río Paraná Medio, Argentina. *Ornitología Neotropical*, 1 (1–2), 3–8. Recuperado de <https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/on/v001n01-02/p0003-p0009.pdf>
- [10] Massoia, E. (1988). Presas de *Buteo magnirostris* en el Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. *Aprona Boletín Científico* 10, 8–10. Recuperado de http://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/BoletinAPRONA_10_sep1988.pdf
- [11] MAE. (2013). Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. *Ambiente del Ecuador*. Quito, Ecuador. Recuperado de http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEYENDA-ECOSISTEMAS_ECUADOR_2.pdf
- [12] Albuja, L., Almendáriz, A., Barriga, R., Cáceres, F., Montalvo, L., Román, J. (2012). *Fauna de Vertebrados del Ecuador*. Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador.
- [13] Vallejo, A. F., Boada, C. (2016). *MammaliaWebEcuador*. Version 2016.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuperado de <http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?id=2055>
- [14] de la Sancha, N.U., D'Elia, G. 2015. Additions to the Paraguayan mammal fauna: the first records of two marsupials (Didelphimorphia, Didelphidae) with comments on the alpha taxonomy of *Cryptonanus* and *Philander*. *Mammalia*, 79(3), 343–356. DOI: <https://doi.org/10.1515/mammalia-2013-0176>
- [15] de la Sancha, N., Pérez-Hernandez, R., Costa, L.P., Brito, D., Cáceres, N. (2016). *Philander opossum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T40516A22176779. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T40516A22176779.en>
- [16] Castro, I., Zarza, H., Medellín, R. (2000). (*Philander opossum*). *Mammalian Species*, 638, 1–8. DOI: [http://dx.doi.org/10.1644/1545-1410\(2000\)638<0001:PO>2.0.CO;2](http://dx.doi.org/10.1644/1545-1410(2000)638<0001:PO>2.0.CO;2)
- [17] Bó, M., Baladrón, A., Biondi, L. M. (2007). Ecología Trófica de Falconiformes y Strigiformes: tiempo de síntesis. *El Hornero*, 22(2), 97–115. Recuperado de <http://www.scielo.org.ar/pdf/hornero/v22n2/v22n2a03.pdf>
- [18] Ballarini, Y., Frizzas, M. R., Marini, M. A. (2013). Stomach contents of Brazilian non-passerine birds. *Revista Brasileira de Ornitología*, 21(4), 235–242. Recuperado de <http://www4.museu-goeldi.br/revistabromito/revista/index.php/BJO/article/view/5401>
- [19] Castro, I., Zarza, H., Medellín, R. (2000). (*Philander opossum*). *Mammalian Species*, 638, 1–8. DOI: [http://dx.doi.org/10.1644/1545-1410\(2000\)638<0001:PO>2.0.CO;2](http://dx.doi.org/10.1644/1545-1410(2000)638<0001:PO>2.0.CO;2)
- [20] Aguiar, R., Furtado, Y., Cunha, D. (2015). Predation of *Hemidactylus mabouia* (Squamata: Gekkonidae) by *Guira guira* (Cuculiformes: Cuculidae) in northeastern Brazil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitao. Nova Serie*, 37(2), 201–206. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/279529631_Predation_of_Hemidactylus_mabouia_Squamata_Gekkonidae_by_Guira_guira_Cuculiformes_Cuculidae_in_northeastern_Brazil
- [21] Reidy, J. (2009). Nest predators of Lance-tailed Manakins on Isla Boca Brava, Panamá. *Journal of Field Ornithology*, 80(2), 115–118. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/27715319>
- [22] Panasci, T., Whitacre, D. (2000). Diet and Foraging Behavior of Nesting Roadside Hawks in Petén, Guatemala. *The Wilson Bulletin*, 112(4), 555–558. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/4164283?seq=1#page_scan_tab_contents