

**OREJIVIOLETA VENTRIAZUL *Colibri coruscans*  
Y COLACINTILLO COLINEGRO *Lesbia victoriae*,  
CONSUMO DE *Salvia microphylla***

---

**Sparkling Violetear *Colibri coruscans* and Black-tailed Trainbearer  
*Lesbia victoriae* feeding on *Salvia microphylla***

David Alexander Ojeda Chiriboga

---

Investigador independiente. La Vicentina, 170408, Quito, Pichincha, Ecuador.

\*Correo electrónico: [davidojeda98@hotmail.com](mailto:davidojeda98@hotmail.com)

Citación: Ojeda Chiriboga, D. A. (2026). Orejivioleta Ventriazul *Colibri coruscans* y Colacintillo Colinegro *Lesbia victoriae*, consumo de *Salvia microphylla*. *Revista Ecuatoriana de Ornitología*, 12(1), 64–65.  
DOI: <https://doi.org/10.18272/reo.v12i.4055>

---

Recibido:  
10.10.2025

Aceptado:  
18.01.2026

Publicado en línea:  
23.06.2026

Editado por:  
Tatiana Santander

---

La urbanización transforma los ecosistemas naturales y modifica la disponibilidad de recursos para la fauna silvestre. En ciudades como Quito, los colibríes (Trochilidae) han mostrado una notable capacidad de adaptación a ambientes urbanos, aprovechando jardines, huertos y áreas verdes como fuentes de alimento y refugio (Züchner *et al.*, 2020, 2024). Entre las especies más comunes en entornos urbanos en los Andes de Ecuador destacan el Quinde Herrero *Colibri coruscans* y Colacintillo Colinegro *Lesbia victoriae*, ambas generalistas en su alimentación (Mena, 2015).

Diversos estudios en ciudades andinas y de otras regiones de Sudamérica han documentado que *C. coruscans* y *L. victoriae* utilizan una amplia variedad de recursos florales, tanto nativos como introducidos (Mena, 2015; Andrade-Lagos, 2018). Investigaciones en jardines urbanos de Colombia han mostrado que ambas especies se alimentan con frecuencia de plantas cultivadas ornamentales, especialmente aquellas pertenecientes a las familias Onagraceae, Ericaceae, Myrtaceae y Solanaceae (Andrade-Lagos, 2018). En cuanto a la familia Lamiaceae, existen reportes de visitas regulares de colibríes a especies del género *Salvia* en Norteamérica, incluida *S. microphylla*, donde estas plantas son ampliamente utilizadas para atraer colibríes en entornos urbanos y periurbanos.

En esta nota presento observaciones de alimentación de *C. coruscans* y *L. victoriae* en un huerto urbano del barrio La Vicentina (-0,2166, -78,4833; 2850 m s.n.m.), centro norte de Quito, desarrolladas entre 1 de agosto y 30 de septiembre de 2025. El área de estudio abarcó c. 40 m<sup>2</sup> y presentaba plantas cultivadas de *Salvia microphylla*, *Lavandula angustifolia* (Lamiaceae) y *Buddleja globosa* (Scrophulariaceae). Las sesiones de observación se efectuaron diariamente de 15h00 a 17h00, registrando visualmente el comportamiento de las aves mediante anotaciones y fotografías con cámara digital (Tecno Spark Pro 30). La identificación de las especies de colibríes se basó en McMullan & Navarrete (2017). Se contabilizó el número de visitas totales por sesión (cada inserción del pico en flores distintas se contabilizó como una visita). Además, se calculó el tiempo de permanencia aproximado en cada planta y las interacciones interespecíficas observadas. Las plantas fueron identificadas mediante claves fotográficas y comparaciones con descripciones botánicas disponibles para especies ornamentales de Quito (Mena, 2015).

Durante el periodo de observación se registró la presencia regular de *C. coruscans* y *L. victoriae* alimentándose principalmente de *S. microphylla*, además de *B. globosa* y *L. angustifolia*. *Colibri coruscans* fue observado en 18 días distintos, con 6–10 visitas por día utilizando *S. microphylla*. *Lesbia victoriae* fue observado en 22 días, con 4–8 visitas por sesión, alternando entre *S. microphylla* y *L. angustifolia*. *Lesbia victoriae* utilizó *L. angustifolia* de manera ocasional (1–3 visitas por sesión), mientras que *C. coruscans* no fue registrado usando esta especie durante el periodo de observación. Las dos especies realizaron visitas a *B. globosa* de manera esporádica. No observé ataques directos entre individuos de las dos especies cuando ambas coincidieron en una flor, pero sí se observaron persecuciones breves entre individuos de *C. coruscans*.

Este estudio evidencia el uso de *S. microphylla* en la dieta de *C. coruscans* y *L. victoriae* dentro del área urbana de Quito, lo cual podría explicarse por la naturaleza generalista y oportunista de estas especies en la selección floral. De igual manera, un estudio en un área urbana de Colombia ha documentado que ambas especies utilizan regularmente plantas introducidas y ornamentales (Andrade-Lagos, 2018). El consumo de especies de *Salvia* es conocido entre colibríes en varios ecosistemas (Wester & Claßen-Bockhoff, 2006).

Las especies ornamentales introducidas representan un importante recurso alimenticio para colibríes. La dependencia creciente de colibríes hacia plantas exóticas podría reducir la disponibilidad de recursos estacionales propios del ecosistema andino (Mena, 2015). En este sentido, se recomienda fomentar la integración de plantas nativas en jardines urbanos, diversificando la oferta de néctar.

## Referencias

- Andrade Lagos, M. L. (2018). Estudio preliminar de las plantas que usan las aves nectarívoras para su alimentación en tres áreas verdes de Bogotá (Tesis de Licenciatura). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. URL: <http://hdl.handle.net/11349/10238>
- McMullan, M., & Navarrete, L. (2017). *Fieldbook of the birds of Ecuador including the Galapagos Islands and common mammals*. Quito: Ratty ediciones.
- Mena, P. (2015). *La ciudad de la perpetua primavera. Árboles y arbustos del Quito urbano y sus alrededores*. Quito: Quimera Dreams.
- Wester, P., & Claßen-Bockhoff, R. (2006). Hummingbird pollination in *Salvia haenkei* (Lamiaceae) lacking the typical lever mechanism. *Plant Systematics and Evolution*, 257(3), 133–146. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00606-005-0366-9>
- Züchner, T., Boesman, P. F. D., & Kirwan, G. M. (2020). Black-tailed Trainbearer (*Lesbia victoriae*), version 1.0. En S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, & T. S. Schulenberg (Eds.), *Birds of the World*. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. DOI: <http://dx.doi.org/10.2173/bow.bltra1.01>
- Züchner, T., Boesman, P., & Kirwan, G. (2024). Sparkling Violetear (*Colibri coruscans*), version 1.1. En S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, & T. S. Schulenberg (Eds.), *Birds of the World*. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. DOI: <http://dx.doi.org/10.2173/bow.spvear1.01.1>