REVISTA ECUATORIANA DE ORNITOLOGÍA

Dossier: Memorias de la IX Reunión Ecuatoriana de Ornitología

Noviembre 2026

COMPOSICIÓN Y FORMA DEL NIDO DEL MIRLO PIQUINEGRO *Turdus ignobilis* EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Nest composition and structure of the Black-billed Thrush *Turdus ignobilis* in the Ecuadorian Amazon

Carles Barriocanal[1,2,*]
Pablo Alvia[2]
Héctor Cadena[2,3]
Cristina Ríos[3]

[1] Universidad de Barcelona, Barcelona. España.
[2] Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador.
[3] INABIO, Quito. Ecuador.

*Autor para correspondencia: carles.barriocanal@ub.edu

Barriocanal, C., P. Alvia, H. Cadena & C. Ríos (2026). Composición y forma del nido del Mirlo Piquinegro *Turdus ignobilis* en la Amazonía ecuatoriana. *Revista Ecuatoriana de Ornitología, Dossier Memorias de la IX Reunión Ecuatoriana de Ornitología*, 66–67. DOI: https://doi.org/10.18272/reo.vi12.4316

Recibido:	Aceptado:	Publicado en línea:	Editado por:
21.04.2026	05.08.2026	19.11.2026	Juan Freile

Resumen

El Mirlo Piquinegro *Turdus ignobilis* es una especie ampliamente distribuida en la Amazonía de Ecuador. Se asocia principalmente a ambientes abiertos, incluyendo áreas urbanas, parques y jardines, donde forrajea activamente en el suelo. Aunque no es una especie forestal, registros recientes evidencian su presencia en claros antrópicos del bosque amazónico. En la Estación Científica Yasuní (ECY), se ha establecido recientemente como nidificante, con múltiples nidos activos en las estructuras de la estación a una altura de 2,5 m aproximadamente. Ante la escasa información disponible sobre la forma y los materiales que conforman sus nidos, el 22 de marzo de 2025 recolectamos un nido ubicado en una cornisa de madera de la estación, a 2,30 m de altura, unos días después de la fuga de los dos pichones. El nido se midió (altura, diámetro y profundidad), y fue sometido a un análisis estructural. Los componentes del nido fueron separados, identificados y cuantificados. El nido tenía forma de vasija, un diámetro de 10,5 mm y un peso de 223,3 gr. Estuvo dominado por barro (206 gr, 92% del peso total), con una proporción reducida de materia vegetal en su interior (17,3 gr, 8% del peso total).

El material vegetal no conformaba un revestimiento mullido para los huevos y estuvo compuesto principalmente por helechos (*Solanopteris brunei*, 13%), raíces de epífitas y hemiepífitas (14%), trepadoras (*Asplundia* sp., 9%), hojas de *Heliconia vellerigera* (12%), hojas de *Sphaeradenia sp.* (6%) y fibras de *Oenocarpus bataua* (7,5%). Este estudio, basado en un único nido exitoso, constituye una aproximación preliminar. El análisis de un mayor número de nidos en la ECY y la comparación con nidos de otros hábitats, permitirá evaluar la variabilidad en la composición y arquitectura del nido, y determinar si la selección de materiales responde a preferencias específicas o a la disponibilidad local de recursos.

Palabras clave

Zorzal Piquinegro, estructura de nido, composición de nido, Yasuní.